

Loire-Atlantique (2017-2019)

8 162 cas invasifs par an en moyenne

(7 151 tumeurs solides et 1 011 hémopathies malignes)

| | HOMMES | | | FEMMES | | |
|---|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | Cas | Freq | TIs | Cas | Freq | TIs |
| Tumeurs solides | 3975 | 87,7 | 321,3 | 3176 | 87,4 | 234,7 |
| Lèvre-bouche-pharynx | 229 | 5,1 | 20,4 | 74 | 2,0 | 5,4 |
| Oesophage | 96 | 2,1 | 7,7 | 24 | 0,7 | 1,5 |
| Estomac | 88 | 1,9 | 6,7 | 44 | 1,2 | 2,4 |
| Intestin grêle | 20 | 0,4 | 1,6 | 20 | 0,6 | 1,4 |
| Côlon - rectum | 436 | 9,6 | 33,3 | 397 | 10,9 | 23,5 |
| Foie | 230 | 5,1 | 17,6 | 43 | 1,2 | 2,2 |
| Vésicule et voies biliaires | 26 | 0,6 | 1,9 | 23 | 0,6 | 1,1 |
| Pancréas | 130 | 2,9 | 9,4 | 127 | 3,5 | 6,9 |
| Fosses nasales, sinus et oreilles | 9 | 0,2 | 0,8 | 6 | 0,2 | 0,4 |
| Larynx | 67 | 1,5 | 5,8 | 8 | 0,2 | 0,7 |
| Poumon | 580 | 12,8 | 47,6 | 274 | 7,5 | 19,8 |
| Plèvre | 21 | 0,5 | 1,3 | 8 | 0,2 | 0,3 |
| Mélanome de la peau | 182 | 4,0 | 16,3 | 174 | 4,8 | 14,4 |
| Sein | 11 | 0,2 | 0,8 | 1235 | 34,0 | 101,5 |
| Col de l'utérus | | | | 58 | 1,6 | 5,8 |
| Corps de l'utérus | | | | 140 | 3,9 | 9,4 |
| Ovaire | | | | 102 | 2,8 | 7,2 |
| Vulve | | | | 15 | 0,4 | 0,8 |
| Prostate | 1212 | 26,7 | 94,7 | | | |
| Testicule | 52 | 1,1 | 7,3 | | | |
| Rein | 152 | 3,4 | 13,0 | 76 | 2,1 | 5,3 |
| Vessie | 169 | 3,7 | 11,4 | 41 | 1,1 | 1,7 |
| Mélanome de l'uvée | 8 | 0,2 | 0,7 | 6 | 0,2 | 0,4 |
| Système nerveux central | 54 | 1,2 | 5,2 | 51 | 1,4 | 4,3 |
| Thyroïde | 33 | 0,7 | 3,5 | 87 | 2,4 | 9,2 |
| Sarcome des tissus mous | 27 | 0,6 | 2,5 | 22 | 0,6 | 1,9 |
| Sarcome osseux | 8 | 0,2 | 1,1 | 5 | 0,1 | 0,7 |
| Hémopathies malignes | 556 | 12,3 | 45,4 | 455 | 12,5 | 29,7 |
| Lymphome de Hodgkin | 19 | 0,4 | 2,7 | 16 | 0,4 | 2,4 |
| Lymphomes malins non Hodgkiniens (LMNH) | 386 | 8,5 | 31,4 | 311 | 8,6 | 20,0 |
| LLC / lymph. lymphocytaire | 59 | | 4,5 | 46 | | 2,6 |
| Lymphome folliculaire | 33 | | 2,7 | 38 | | 2,7 |
| Lymphome diffus à grandes cellules B | 55 | | 4,1 | 53 | | 3,5 |
| Lymphome à cellules du manteau | 11 | | 0,9 | 4 | | 0,2 |
| Lymphome de la zone marginale | 26 | | 1,9 | 26 | | 1,8 |
| Myélome / Plasmocytome | 68 | | 5,1 | 57 | | 3,1 |
| LLP / Maladie de Waldenström | 35 | | 2,5 | 18 | | 1,0 |
| Lymphome T/NK à cellules matures | 31 | | 2,8 | 20 | | 1,6 |
| Leucémie/lymphome lymphoblastique B, T, SAI | 13 | | 2,5 | 7 | | 1,4 |
| Leucémie aiguë myéloïde | 29 | 0,6 | 2,5 | 31 | 0,9 | 2,1 |
| Syndromes myéloprolifératifs chroniques (SMP) | 61 | 1,3 | 5,2 | 49 | 1,3 | 3,0 |
| Leucémie myéloïde chronique | 9 | | 0,9 | 4 | | 0,3 |
| Syndrome myélodysplasique (SMD) | 39 | 0,9 | 2,2 | 29 | 0,8 | 1,3 |
| SMP/SMD | 16 | 0,4 | 0,9 | 14 | 0,4 | 0,6 |
| Tous cancers | 4531 | 100,0 | 366,7 | 3632 | 100,0 | 264,4 |

NB : Les localisations cancéreuses ne sont pas listées de manière exhaustive dans ce tableau.

Cas : nombre moyen de nouveaux cas apparus dans une population donnée sur la période étudiée.

Freq (%) - Fréquence relative : proportion du nombre de cas de la localisation cancéreuse étudiée par rapport à l'ensemble de tous les cancers.

TIs (pour 100 000 personnes exposées) - Taux d'incidence standardisé : c'est l'incidence qu'on observerait dans la population étudiée si elle avait la même structure d'âge que la population de référence (ici la population mondiale). Le TIs permet de faire des comparaisons entre départements.

LLC : Leucémie lymphoïde chronique / LLP : Lymphome lymphoplasmocytaire